

DO YOU THINK YOUR CHILD HAS MEASLES?


What to do if you think your child has measles

Measles usually starts with a fever, cough, runny nose, and red eyes that leads to a rash. If someone in your family has measles symptoms:

Keep them away from family members that are not sick.

Everyone in the house should stay home to not get your neighbors or people outside of your home sick.

Call a doctor or hospital right away to let them know someone in your home is sick with measles. They will give you instructions.




When to go to the emergency room

If the person who is sick gets rapidly worse or has any of symptoms below take them to the emergency department of a hospital immediately.

DO NOT WAIT.



Trouble breathing
(or breathing faster than normal)



Pain when breathing or coughing



Dehydration
(dry nose and mouth, urinating less, crying without making tears)



Fever or headache will not stop



Confusion, decreased alertness, or severe weakness



Blue color around the mouth, low energy, or difficulty feeding
(for young children)

Have someone call before you arrive. Let the hospital know a person with measles is coming.

BE READY FOR MEASLES
[cdc.gov/measles](https://www.cdc.gov/measles)



¿CREE QUE SU HIJO TIENE SARAMPIÓN?

Qué hacer si cree que su hijo tiene sarampión

El sarampión suele empezar con fiebre, tos, moqueo y ojos rojos que provocan un sarpullido. Si alguien de su familia tiene síntomas de sarampión:

Manténgalo alejado de los miembros de la familia que no están enfermos.

Todos los miembros de la familia deben quedarse en casa para no contagiar a los vecinos o a otras personas.

Llame inmediatamente al médico o al hospital para informarles de que alguien en su casa está enfermo de sarampión. Le darán instrucciones.




Cuándo acudir a un centro de atención de urgencias

Si empeora rápidamente, o presenta alguno de estos síntomas, vaya inmediatamente a la sala de urgencias de un hospital.

NO ESPERE.



Dificultad para respirar (o respiración más rápida de lo normal)



Dolor al respirar o toser



Deshidratación (sequedad de la nariz o boca, orinar menos, llorar sin lágrimas)



Fiebre o dolor de cabeza que no para



Confusión, disminución del estado de alerta o debilidad severa



Color azul alrededor de la boca, poca energía, o dificultad para alimentar (en niños pequeños)

Pida que alguien llame antes de llegar. Avise al hospital de que viene una persona con sarampión.

PREPÁRESE PARA EL SARAMPIÓN
cdc.gov/measles

